


Wat onderzoeken we?


De frequentie, het beloop, de belasting en het herhalingsrisico van klachten bij kinderen gevaccineerd binnen het Rijksvaccinatieprogramma op de leeftijd van 2, 3 en 5 maanden.




6-9 weken



3 maanden




5 maanden



Betekenis afkortingen

Rota	Rotavirus
D	Difterie
K	Kinkhoest
T	Tetanus
P	Polio
Hib	Haemophilus influenzae type b
HepB	Hepatitis B
Pneu	Pneumokokken



Deelnemers



In het onderzoek zitten 6,211 deelnemers, waarvan 542 (9%) een extra DKTP-Hib-HepB vaccinatie kregen bij het vaccinatiemoment met 2 maanden.

Bij de mensen die ≥ 1 klacht rapporteren wordt gemiddeld 1.7 klacht ervaren na het 1^e vaccinatiemoment (6-9 weken). Na het 2^e en 3^e moment was dit gemiddeld respectievelijk 1.9 en 1.7 klacht.

Aantal deelnemers per vaccinatiemoment




Resultaten vragenlijstonderzoek



Ervaren bijwerkingen na vaccinaties bij de leeftijd van 2, 3 en 5 maanden

2 maanden (Rota)

Meest gerapporteerde klachten



Latentietijd (uren)





3 maanden (Rota, DKTP-Hib-HepB, Pneu)

Meest gerapporteerde klachten




Latentietijd (uren)



5 maanden (DKTP-Hib-HepB, Pneu)

Meest gerapporteerde klachten



Latentietijd (uren)

