

Bijwerkingen Griep- & pneumokokkenvaccinatie



Wat hebben wij onderzocht?

Elk najaar worden bepaalde risicogroepen gevaccineerd met het griep- en/of pneumokokkenvaccin. Lareb onderzoekt elk seizoen welke bijwerkingen na deze vaccinaties worden ervaren.



Hoe zijn we te werk gegaan?

Data uit drie verschillende bronnen werd gebruikt: het meldformulier, het vragenlijstonderzoek van Lareb (vaccinmonitor) en het vragenlijstonderzoek van Moeders van Morgen. Lees hieronder meer over de drie databronnen.

Onderzoeken



bijwerkingen
centrum
lareb

Meldingen

Tussen half september 2025 en april 2026 zijn er **1.043** meldingen ontvangen, waarvan:

- **57%** over het griepvaccin
- **29%** over het pneumokokkenvaccin
- **14%** over beide vaccins

Totaal zijn er **3.133** vermoede bijwerkingen gemeld.





vaccin
monitor
lareb

Vragenlijstonderzoek

Er hebben **401** deelnemers minstens één vragenlijst ingevuld en daarvan ontving:

- **64%** het griepvaccin
- **4%** het pneumokokkenvaccin
- **32%** beide vaccins

Van de deelnemers rapporteerde **56%** één of meer bijwerking(en).




moeders
van morgen
lareb

Vragenlijstonderzoek zwangere vrouwen

In het Moeders van Morgen onderzoek zaten **219** zwangere vrouwen die in het vaccinatie seizoen 2025-2026 het griepvaccin hebben gekregen.

Van **217** deelnemers was informatie over mogelijk ervaren bijwerkingen beschikbaar. Van deze vrouwen gaf **14%** aan minimaal één bijwerking te hebben ervaren na vaccinatie.



+ met een medische reden voor vaccinatie

Gemelde bijwerkingen

Welke bijwerkingen komen het meest voor?*

Hoofdpijn
Koude rillingen
Vermoeidheid
Misselijkheid
Koorts
Prikplaatsreactie
Niet lekker voelen
Spierpijn
Gewrichtspijn

*Hoe groter een woord is, hoe vaker deze bijwerking is genoemd.

Elke melder of deelnemer kan één of meer bijwerkingen melden. Er waren 31 meldingen met vermoeden van ernstige bijwerkingen.

De bekende bijwerkingen prikplaatsreacties, niet lekker voelen, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid werden het vaakst genoemd als mogelijke bijwerkingen.

Op de prikplaats werden pijn, roodheid, warmte, zwelling en ontsteking het vaakst gemeld.

Conclusie: Het type bijwerkingen na deze vaccinaties was vergelijkbaar met dat van vorige jaren. Bij het griepvaccin zijn er geen nieuwe of onverwachte bijwerkingen naar voren gekomen. Bij het pneumokokkenvaccin viel uitgebreide zwelling van de gevaccineerde arm en late reacties op de prikplaats op.