

Griep- & Pneumokokkenvaccinatie



Wat hebben wij onderzocht?

Elk najaar worden bepaalde risicogroepen gevaccineerd met het griep- en/of pneumokokkenvaccin. Lareb onderzoekt elk seizoen welke bijwerkingen na deze vaccinaties worden ervaren. Daarnaast brengen we ook het beloop en mogelijke risicofactoren van deze bijwerkingen in kaart.



Hoe zijn we te werk gegaan?

Data uit drie verschillende bronnen werd gebruikt: het meldformulier, het vragenlijstonderzoek van Lareb (vaccinmonitor) en het vragenlijstonderzoek van Moeders van Morgen. Lees hieronder meer over de drie databronnen.

Onderzoeken



bijwerkingen
centrum
lareb

Meldingen

Tussen oktober 2024 en maart 2025 zijn er **1.171** meldingen ontvangen, waarvan:

- 41%** over het griepvaccin
- 37%** over het pneumokokkenvaccin
- 22%** over beide vaccins

Totaal zijn er **4.340** vermoede bijwerkingen gemeld.




vaccin
monitor
lareb

Vragenlijstonderzoek

Er hebben **348** deelnemers minstens één vragenlijst ingevuld en daarvan ontving:

- 60%** het griepvaccin
- 3%** het pneumokokkenvaccin
- 37%** beide vaccins

Van de deelnemers rapporteerde **77%** één of meer bijwerking(en).




moeders
van morgen
lareb

Vragenlijstonderzoek zwangere vrouwen

In het Moeders van Morgen onderzoek zaten **302** zwangere vrouwen die in het vaccinatieseizoen 2024-2025 het griepvaccin hebben gekregen.

Van **297** deelnemers was informatie over mogelijk ervaren bijwerkingen beschikbaar. Van deze vrouwen gaf **19%** aan minimaal één bijwerking te hebben ervaren na vaccinatie.



*met een medische reden voor vaccinatie

Gemelde bijwerkingen

Welke bijwerkingen komen het meest voor?*

Koude rillingen
Spierpijn
Hoorts
Vermoeidheid
Prikplaatsreactie
Hoofdpijn
Misselijkheid
Niet lekker voelen
Gewrichtspijn

*Hoe groter een woord is, hoe vaker deze bijwerking is genoemd.

Elke melder of deelnemer kan één of meer bijwerkingen melden. De bekende bijwerkingen werden het vaakst gemeld. Er waren 19 meldingen met vermoeden van ernstige bijwerkingen. Lees hier meer over in het [volledige rapport](#).

De bekende bijwerkingen prikplaatsreacties, spierpijn en niet lekker voelen werden het vaakst genoemd als mogelijke bijwerkingen.

Pijn, roodheid en zwelling op de prikplaats werd het vaakst gemeld bij het pneumokokkenvaccin.

Conclusie: Het type bijwerkingen na deze vaccinaties was vergelijkbaar met dat van vorige jaren. Er zijn geen nieuwe of verontrustende bijwerkingen naar voren gekomen in het kader van de vaccinveiligheid.

