

Resultaten

HPV vaccinatie (10 jaar)

hpv
monitor
lareb



Wat houdt het onderzoek in?

De frequentie, het beloop, de belasting en het herhalingsrisico van klachten bij kinderen gevaccineerd binnen het Rijksvaccinatieprogramma op 9-jarige en 10-jarige leeftijd.





Hoe zijn we te werk gegaan?

Deelnemers ontvangen na elke vaccinatie een vragenlijst waarin ze hun klachten kunnen delen. Binnen enkele weken ontvangen zij een vervolgvragenlijst om het beloop te monitoren.

Deelnemersinformatie

Er waren **3063** deelnemers met een eerste HPV vaccinatie. Hiervan hebben **2209** ook een tweede HPV vaccinatie gehad.



Gemelde klachten

Na de eerste HPV vaccinatie hebben **1812 (59%)** van de deelnemers minimaal één klacht gerapporteerd. Na de tweede HPV vaccinatie waren dit **914 (41%)**.

Er werden voornamelijk **bekende klachten** gerapporteerd:

	Na 1 ^e HPV vaccinatie	Na 2 ^e HPV vaccinatie
Reacties op de prikplek	47%	32%
Hoofdpijn	8%	4%
Gewrichtspijn	5%	4%

De deelnemers hebben **geen** ernstige klachten gerapporteerd.

Wat is het verschil...

...tussen de eerste en de tweede vaccinatie?

Deelnemers die beide HPV vaccinaties hebben gehad rapporteren meer klachten na de eerste vaccinatie dan de tweede vaccinatie.

...tussen jongens en meisjes?

Meisjes rapporteren vaker een klacht dan jongens.

Interesse in alle resultaten?
Lees het volledige rapport op:
www.hpvmonitor.nl

Ten minste één klacht gerapporteerd

	Eerste vaccinatie	Tweede vaccinatie
Jongen	55,3%	38,5%
Meisje	61,2%	44,2%

Uitgevraagde klacht gerapporteerd

	Eerste vaccinatie	Tweede vaccinatie
Jongen	48,6%	33%
Meisje	53,7%	39%

Andere klacht gerapporteerd

	Eerste vaccinatie	Tweede vaccinatie
Jongen	15,6%	9,7%
Meisje	17,8%	9,5%