



Ouderen vallen vaker na staaroperatie

In de periode tussen de staaroperatie aan het eerste oog en die aan het tweede, lopen ouderen twee keer zo veel risico om in het ziekenhuis te belanden door een val. Opmerkelijk, je zou verwachten dat een beter zicht er juist voor zou zorgen dat ouderen minder snel vallen. Australische onderzoekers die patiënten na een staaroperatie volgden, denken dat ze juist in de periode tussen de twee operaties niet snel genoeg een nieuwe bril aanschaffen. Ook moeten ze wennen aan de nieuwe manier waarop ze diepte zien. Na de operatie aan het tweede oog daalde het risico weer.

<http://tinyurl.com/vallen-na-staaroperatie>

Proef met tweedehandsmedicijnen

Tien Nederlandse ziekenhuizen onderzoeken de mogelijkheid om teruggebrachte kanker- en reumamedicijnen veilig voor te kunnen schrijven aan nieuwe patiënten. Een chip meet bij de medicijnen op welke temperatuur ze zijn bewaard. Aan de hand van deze gegevens onderzoeken de ziekenhuizen of deze dure medicijnen nog bruikbaar zijn. Sommige kosten wel €2000.

Carl Jakobs van de Consumentenbond is blij met de proef. 'Wij zoeken al langer naar manieren om verspilling van medicijnen tegen te gaan. Dit kan een mooie manier zijn om te besparen op zorgkosten.' Als de proef uitwijst dat de teruggebrachte medicijnen veilig te gebruiken zijn, ziet Jakobs graag ook een onderzoek naar de juiste wijze om patiënten te compenseren. 'Ik kan me voorstellen dat je iets wilt terugzien als je die medicijnen uit je eigen risico hebt betaald.'

<http://tinyurl.com/tweedehandsmedicijnen>

Bittere Pil vermeldt geneesmiddelen die van de markt zijn genomen of waarvan belangrijke nieuwe bijwerkingen zijn ontdekt.

bittere pil

Mirtazapine

Middel bij depressie

Mirtazapine (Remeron) behoort tot de groep geneesmiddelen die bij de behandeling van depressie wordt ingezet. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties. Net als bij elk ander medicijn kunnen bij dit geneesmiddel bijwerkingen optreden. Sufheid, droge mond en hoofdpijn zijn het bekendst. Een veel minder bekende bijwerking, die nog niet in de bijsluiters wordt vermeld, is urineretentie. Urineretentie is moeilijk kunnen plassen, waardoor de blaas vol raakt. Dat veroorzaakt een gevoel van terugkerende aandrang tot plassen, en dan steeds kleine beetjes. Soms kan er sprake zijn van wat urineverlies.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving acht meldingen van urineretentie en plasproblemen bij het gebruik van mirtazapine. Omdat deze klachten ook andere oorzaken kunnen hebben, luidt het advies dit altijd met uw huisarts te bespreken.

Wilt u zelf een bijwerking melden?
Ga naar www.mijnbijwerking.nl



2.079.172
patiënten bezochten in 2012
de Spoedeisende Hulp

BRON: NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE