



OMEPRAZOL-SUSPENSIE PEDIPPI: MOEILIK DOOR TE SLIKKEN VOOR JONGE KINDEREN



In de rubriek Bijwerking Belicht bespreekt Bijwerkingencentrum Lareb in elk nummer van UA een bijwerking. Dit keer een praktisch probleem: de omeprazol-suspensie van het merk Pedippi is voor sommige jonge kinderen moeilijk door te slikken. Daarom is het advies de Pedippi-suspensie vóór toediening te verdunnen.

PEDIPPI

Pedippi bevat de werkzame stof omeprazol. Omeprazol zorgt ervoor dat de maag minder zuur aanmaakt. Pedippi wordt onder andere voorgeschreven bij brandend maagzuur en zure oprispingen, waarbij er maagzuur terugvloeit in de slokdarm (refluxklachten). Pedippi vermindert deze klachten. De omeprazol-suspensie mag gebruikt worden bij kinderen vanaf vier weken oud. Ook volwassenen mogen Pedippi gebruiken.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Behalve het gewenste effect - namelijk het verminderen van brandend maagzuur en zure oprispingen - kan omeprazol ook bijwerkingen geven. De belangrijkste

bijwerkingen van omeprazol zijn hoofdpijn en maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven, diarree, verstopping en winderigheid.

MELDINGEN BIJ BIJWERKINGENCENTRUM LAREB

Bijwerkingencentrum Lareb ontving in korte tijd een paar meldingen over het gebruik van Pedippi bij jonge kinderen tussen 0 en 1 jaar oud. Deze meldingen gingen niet over bijwerkingen van Pedippi, maar over problemen met de suspensie (2 mg/ml). De jonge kinderen konden de Pedippi-suspensie niet goed doorslikken, omdat deze te dik en te slijmerig was. Zij kregen hierdoor bijna geen adem.

Een van deze meldingen werd gedaan door een apotheker. Die beschreef dat zij al vaker klachten hadden ontvangen over de omeprazol-suspensie van het merk Pedippi. Een andere melding kwam van een ouder of verzorger. In de melding stond dat zij overgestapt waren van een ander omeprazol-merk op Pedippi. Zowel met het spuitje als met een lepel kreeg het kind de Pedippi-suspensie niet doorgeslikt. Daarna is geprobeerd de suspensie toe te dienen via een sonde - wat volgens de bijsluiter ook moet kunnen - maar deze raakte verstopt. Inmiddels is men voor het kind weer overgestapt op het andere merk. Bijwerkingencentrum Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geïnformeerd over de meldingen. Het advies is nu om de Pedippi-suspensie bij jonge kinderen te verdunnen met een klein beetje melk (20-30 ml). Het CBG heeft de fabrikant van Pedippi gevraagd dit advies op te nemen in de bijsluiter.

ADVIES VOOR IN DE APOTHEEK

Informeert ouders over het feit dat de Pedippi-suspensie voor sommige jonge kinderen moeilijk door te slikken is en dat zij Pedippi het beste kunnen verdunnen met een klein beetje melk. Het doorslikken gaat hierdoor makkelijker. Dit verkleint het risico op slik- en ademhalingsproblemen bij jonge kinderen. <

Marijn van Es, medisch bioloog, werkzaam bij Bijwerkingencentrum Lareb